



M1

Вежбе 6

Данијел
Алексић

Аналитичка
геометрија у
простору

Једначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни

2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак

Математика 1

Вежбе 6

Данијел Алексић

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука



2023.

М1

Вежбе 6

Данијел
АлексићАналитичка
геометрија у
просторуЈедначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни

2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак


Представити неки скуп тачака у \mathbb{R}^3 (раван, праву итд) једначином значи формирати једнакост облика $f(x, y, z) = 0$, при чему тачка (x, y, z) припада том скупу тачака **ако и само ако** претходна једнакост за њу важи.

Нпр. ускоро ћемо видети да свака раван у \mathbb{R}^3 има једначину облика

$$ax + by + cz + d = 0,$$

где су a, b, c и d неки реални бројеви.

Знамо да је раван јединствено одређена трима својим тачкама. Ипак, овде ће бити згодно користити другу карактеризацију: Раван π је јединствено одређена једном својом тачком $P_0(x_0, y_0, z_0)$ и вектором нормале на раван, $\vec{n} = (a, b, c)$ (види слику).



Тачка $P(x, y, z)$ припада равни ако и само ако је $\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0$, односно


$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (a, b, c) = 0,$$

то јест

$$ax + by + cz + \underbrace{(-ax_0 - by_0 - cz_0)}_{=d} = 0.$$

$$\boxed{\pi : ax + by + cz + d = 0}$$

Нека су сада дате три тачке које припадају равни π : $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B, z_B)$ и $C(x_C, y_C, z_C)$. Тражимо једначину равни π .



Тачка $P(x, y, z)$ припада равни π ако и само ако вектори \vec{AP} , \vec{AB} и \vec{AC} леже у истој равни, односно ако је

$$[\vec{AP}, \vec{AB}, \vec{AC}] = 0.$$

Добијамо једначину равни која садржи тачке A , B и C :

$$\pi : \begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A & z - z_A \\ x_B - x_A & y_B - y_A & z_B - z_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A & z_C - z_A \end{vmatrix} = 0$$

И ова једначина се своди на облик $ax + by + cz + d = 0$ након рачунања детерминанте.

Задатак

Написати једначину равни π која садржи тачке $A(1, 1, 1)$, $B(0, -1, 2)$ и $C(2, 3, -1)$.

Задатак се може урадити на (барем) три начина.

Први начин јесте коришћењем „готове формуле“. Раван π има једначину:

$$\pi : \begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A & z - z_A \\ x_B - x_A & y_B - y_A & z_B - z_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A & z_C - z_A \end{vmatrix} = 0,$$

односно

$$\pi : \begin{vmatrix} x - 1 & y - 1 & z - 1 \\ 0 - 1 & -1 - 1 & 2 - 1 \\ 2 - 1 & 3 - 1 & -1 - 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Средимо:

$$\pi : \begin{vmatrix} x - 1 & y - 1 & z - 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

Развијемо по првој врсти:

$$\pi : (x - 1)(4 - 2) - (y - 1)(2 - 1) + (z - 1)(-2 + 2) = 0,$$

$$\pi : 2(x - 1) - (y - 1) = 0,$$

па добијамо једначину равни π :

$$\boxed{\pi : 2x - y - 1 = 0.}$$

Други начин јесте решавањем система. Знамо да свака раван, па и наша π има једначину облика

$$\pi : ax + by + cz + d = 0.$$

Тачка $A(1, 1, 1)$ задовољава једначину равни π :

$a \cdot 1 + b \cdot 1 + c \cdot 1 + d = 0$. Тачка $B(0, -1, 2)$ задовољава једначину равни π : $a \cdot 0 + b \cdot (-1) + c \cdot 2 + d = 0$. Тачка $C(2, 3, -1)$ задовољава једначину равни π :

$a \cdot 2 + b \cdot 3 + c \cdot (-1) + d = 0$. Добијамо систем једначина:

$$a + b + c + d = 0$$

$$- b + 2c + d = 0$$

$$2a + 3b - c + d = 0.$$

Решимо га.



М1

Вежбе 6

Данијел
Алексић

Аналитичка
геометрија у
простору

Једначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни

2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак

$$a + b + c + d = 0$$

$$- b + 2c + d = 0$$

$$2a + 3b - c + d = 0.$$

$$a + b + c + d = 0$$

$$- b + 2c + d = 0$$

$$b - 3c - d = 0 \quad III - 2I$$

$$a + b + c + d = 0$$

$$- b + 2c + d = 0$$

$$- c = 0 \quad III + II$$

Добијамо $c = 0$ и остаје нам да решимо

$$\begin{aligned} a + b + d &= 0 \\ -b + d &= 0 \end{aligned}$$

што је систем са више непознатих од једначина. Узимамо $d = t$, $t \in \mathbb{R}$, као параметар. Добијамо $b = t$ и $a = -2t$.

Дакле:

$$(a, b, c, d) = (-2t, t, 0, t) = -t(2, -1, 0, -1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Узимамо **било које не-нула решење**, рецимо $t = -1$.

Добијамо да је једначина равни π :

$$\boxed{\pi : 2x - y - 1 = 0.}$$

Слобода да бирамо t заправо одговара чињеници да горња једнакост остаје тачна (и еквивалентна претходној) када се помножи **било којим ненула бројем**.

Овде треба застати и покушати сmisлити трећи начин решавања задатка, који укључује употребу векторског производа. Скица решења је на наредном слайду.

Трећи начин био би формирањем вектора нормале.

Вектори $\vec{AC} = (1, 2, -2)$ и $\vec{BC} = (2, 4, -3)$ леже у равни π , тј. оба су паралелна са π . Значи да је вектор нормале на раван π , зовимо га \vec{n}_π нормалан на оба, па се може узети да буде њихов векторски производ.

$$\vec{n}_\pi = \vec{AC} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -3 \end{vmatrix} = \dots = (2, -1, 0),$$


па је

$$\pi : 2x - y + d = 0.$$


Уврштавањем координата било које од тачака A , B , C , добијамо $d = -1$, па је, наравно:

$$\boxed{\pi : 2x - y - 1 = 0.}$$

Секу се
(постоји угао између њих)




Паралелне су
(не постоји угао између њих)



Косинус оштрог угла између њих:


$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{|\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta|}{|\vec{n}_\alpha| |\vec{n}_\beta|}$$

Поклапају се
(угао је нула)



Задатак

Наћи једначину равни π која садржи тачку $A(2, -1, 1)$ и нормална је на равни $\alpha : 3x + 2y - z + 4 = 0$ и $\beta : x + y + z - 3 = 0$.



Како раван π мора да буде нормална и на α и на β , њен вектор нормале мора бити нормалан на њихове. Имамо да је

$$\vec{n}_\alpha = (3, 2, -1), \quad \vec{n}_\beta = (1, 1, 1)$$

Можемо узети $\vec{n}_\pi = \vec{n}_\alpha \times \vec{n}_\beta$.

$$\vec{n}_\pi = \vec{n}_\alpha \times \vec{n}_\beta = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3, -4, 1).$$

Дакле, раван π има једначину

$$\pi : 3x - 4y + z + d = 0.$$

И даље нисмо искористили чињеницу да тачка $A(2, -1, 1)$ лежи у равни π .

$$3 \cdot 2 - 4 \cdot (-1) + 1 + d = 0$$

$$11 + d = 0$$

$$d = -11$$

Дакле, раван π има једначину

$$\boxed{\pi : 3x - 4y + z - 11 = 0.}$$

Када научимо рачун са правама, вратити се овде и покушати решити задатак проналажењем пресечне праве равни α и β .

М1

Вежбе 6

Данијел

Алексић

Аналитичка
геометрија у
просторуЈедначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни

2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак

Претпоставимо да имамо раван

$$\pi : ax + by + cz + d = 0$$

и да је $d \neq 0$. (Шта за раван значи да је $d = 0$?)

Једначина равни се тада може трансформисати у

$$\pi : \frac{x}{-d/a} + \frac{y}{-d/b} + \frac{z}{-d/c} = 1,$$

односно, увођењем нових слова,

$$\pi : \frac{x}{m} + \frac{y}{n} + \frac{z}{p} = 1.$$

Бројеви m , n и p представљају одсечке које раван π одсеца на осама x , y и z редом.



M1

Вежбе 6

Данијел
Алексић

Аналитичка
геометрија у
простору

Једначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни

2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак

Нека имамо раван

$$\pi : ax + by + cz + d = 0$$

и тачку $A(x_A, y_A, z_A)$.

Растојање тачке A од равни π дато је формулом

$$d(A, \pi) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Овде ову формулу нећемо изводити (има у уџбенику).

М1

Вежбе 6

Данијел
АлексићАналитичка
геометрија у
просторуЈедначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни

2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак

Задатак

Испитати узајамни положај равни α и β . Ако су паралелне, израчунати растојање између њих, а ако се секу, израчунати оштар угао који заклапају.

- (а) $\alpha : x - y + 1 = 0$, $\beta : y - z + 1 = 0$;
- (б) $\alpha : x - 2y + z - 1 = 0$, $\beta : 2x - 4y + 2z - 1 = 0$.

Решавамо део (а). Видимо да су вектори нормала $\vec{n}_\alpha = (1, -1, 0)$ и $\vec{n}_\beta = (0, 1, -1)$. Ова два вектора очигледно јесу линеарно независна, па се равни α и β секу. За угао између њих важи:

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{|\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta|}{|\vec{n}_\alpha| |\vec{n}_\beta|} = \frac{|(1, -1, 0) \cdot (0, 1, -1)|}{\sqrt{1+1+0} \sqrt{0+1+1}} = \frac{1}{2}.$$

Дакле, $\angle(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{3}$.

Решавамо део (б). Видимо да је

$$\vec{n}_\alpha = (1, -2, 1), \quad \vec{n}_\beta = (2, -4, 2) = 2\vec{n}_\alpha.$$

Дакле, равни су или паралелне, или се поклапају. Међутим, ако обе стране једначине равни α помножимо са 2, видимо да је

$$\alpha : 2x - 4y + 2z - 2 = 0, \quad \beta : 2x - 4y + 2z - 1 = 0,$$

што није иста једначина. Дакле равни се не поклапају, већ су паралелне. Зато тражимо растојање између њих. Знамо само формулу за растојање **тачке** од равни, не и равни од равни. Зато бирамо једну тачку са равни α . Речимо, ако ставимо да је $y = z = 0$, добијамо да је $x = 1$, па тачка $A(1, 0, 0)$ лежи у равни α . Дакле:

$$d(\alpha, \beta) = d(A, \beta) = \frac{|2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 1|}{\sqrt{2^2 + (-4)^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{24}}.$$

М1

Вежбе 6

Данијел
АлексићАналитичка
геометрија у
просторуЈедначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни


2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак



Скуп свих равни које садрже пресек равни $\alpha : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ и $\beta : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ зове се **прамен**, или **сноп** и може се представити наредном једначином, коју нећемо изводити:

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 + \lambda(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0.$$

Мењањем $\lambda \in \mathbb{R}$ добијамо различите равни из прамена.
Која је раван из прамена која се једина не може добити на овај начин?

Задатак

Одредити једначину равни π која садржи пресек равни $\alpha : x + 2y + 3z - 4 = 0$ и $\beta : 3x + z - 5 = 0$ и која на координатним осама Oy и Oz одсеца подударне одсечке.

Произвольна права из прамена кроз пресек α и β дата је са

$$\pi : x + 2y + 3z - 4 + \lambda(3x + z - 5) = 0.$$

Наше је да нађемо λ тако да важи услов задатка. Згодно је мало трансформисати израз:

$$\pi : (1 + 3\lambda)x + 2y + (3 + \lambda)z + (-4 - 5\lambda) = 0.$$

Одсечак на Oy оси добијамо кад заменимо $x = z = 0$ и изразимо y : $y = \frac{4+5\lambda}{2}$.

Одсечак на Oz оси добијамо кад заменимо $x = y = 0$ и изразимо z : $z = \frac{4+5\lambda}{3+\lambda}$.

Нема бојазни од дељења нулом. За $\lambda = -3$, раван је паралелна са z осом, па на њој не одсеца ништа. Имамо два случаја:

1.1 $\frac{4+5\lambda}{2} = \frac{4+5\lambda}{3+\lambda}$ и $4 + 5\lambda \neq 0$.

Решавањем добијамо $\lambda = -1$, што нам даје раван

$$\pi_1 : -2x + 2y + 2z + 1 = 0.$$

1.2 $\frac{4+5\lambda}{2} = -\frac{4+5\lambda}{3+\lambda}$ и $4 + 5\lambda \neq 0$.

Решавањем добијамо $\lambda = -5$, што нам даје раван

$$\pi_2 : -14x + 2y - 2z + 21 = 0.$$

2 $4 + 5\lambda = 0$, то јест $\lambda = -4/5$. Тада добијамо раван

$$\pi_3 : -\frac{7}{5}x + 2y + \frac{11}{5}z = 0, \text{ односно}$$

$$\pi_3 : -7x + 10y + 11z = 0.$$

Услове задатка задовољавају три равни и то су равни

π_1, π_2 и π_3 .



M1

Вежбе 6

Данијел
Алексић

Аналитичка
геометрија у
простору

Једначина
равни

1. задатак

Узајамни
положај две
равни

2. задатак

Сег. обл.
ј-не равни,
раст. т. од
равни

3. задатак

Прамен
равни

4. задатак

Методичка збирка решених задатака из Математике 1.
Оливера Михић, Владимира Балтић, Марија Боричић.
ФОН, Београд, 2022.